NUEVOS CERAMBICIDOS ARGENTINOS

(Col. Cerambyc.)

ALBERTO F. PROSEN

CERAMBYCIDAE

Eurymerus obscurus sp. n. Holotipo ♂.

Pequeño, mate, obscuro; color general pardo-rojizo-obscuro (116 de Séguy); Long. 11 mm., lat. hum. 2 mm.

Cabeza finamente granulada y punteada, con débil surco longitudinal y una depresión clipeal uniformemente curvada, tubérculos anteníferos poco prominentes y nítidos, con escasos puntos impresos, epicráneo granulado con raras cerditas flavas, gena transversalmente undulada y posteriormente alisada, labro con algunas cerdas largas, mandíbulas rugoso-rojizas, apicalmente lisas y negras, palpos testáceos y glabros.

Antenas subpilosas y con largas cerdas espinosas, escapo rugoso varioloso con ralas cerditas, art. 3.° del mismo aspecto que el anterior, pero con cerdas más largas y numerosas, art. 4.° longitudinalmente rugoso con cerditas, pocas cerdas largas interno-inferiores y una corona apical, compuesta por 6 ó 7 cerdas largas; art. 5.°-10.° menos rugosos que los anteriores y con la misma disposición de las cerdas; art. 11.° finamente granulado, con cerditas cortas.

Protórax deprimido, granulado-punteado, con una área pequeña lanceolada, central, subnítida que no lleva puntos. Prosterno transversalmente rugoso y punteado. Todo con ralos pelitos pálidos y cortos.

Escudete semicircular, con el borde posterior levantado y con escasa pubescencia.

Elitros cubriendo totalmente el abdomen, finamente granulados, con numerosos puntos impresos que llevan en su interior un corto pelito pálido, algunas cerdas largas, seriadas y erectas, más abundantes en el tercio posterior. Cada élitro lleva dos manchas, una, en el 1er. tercio, longitudinalmente alargada y poco nítida y otra post-

mediana, dolabriforme, ebúrnea, transversal y exteriormente un poco avanzada. Espina apical, débil.

Fémures finamente reticulados y con dispersos puntos impresos que llevan largas cerdas.

Tibias y tarsos, con numerosas cerdas y pelitos cortos.

Alotipo ♀.

Semejante al ♂, protórax más corto y con el último segmento abdominal muy alargado, que los élitros dejan descubierto.

Próximo a *E. quadristigma* Goun, del que se diferencia fácilmente por el color, estructura de las antenas, forma y puntuación de la cabeza, etc.



Eurymerus obscurus n. sp. (× 5).

Holotipo y alotipo de Sumampa, Sgo. del Estero XI-1945, Máximo Alberto Alvarado leg.; dos paratipos ♂ y una ♀ de la misma procedencia y colector, XI-1943 y un paratipo ♂ de Campo Gallo X-1943 José S. Farhat leg. en mi colección.

Un paratipo ♀ de Campo Gallo, Sgo. del Estero X-1941, Farhat col. Prosen leg., en la colección Bosq.

Cyllene Mellyi s. sp **Castroi** n. ssp.

Color general pardo, con la misma disposición macular que la especie típica, pero con todas las manchas elitrales de color leonado y dos manchas alargadas que ocupan la porción apical.

La especie típica es negra con manchas leonadas y rojizo-anaranjadas.

Siete cotipos (4 ♂ y 3 ♀) en mi colección.

Dedicada a mi distinguido amigo señor Mario A. Castro, quien recogió el material típico, en Villa Unión, Sgo. del Estero, en III y IV de 1944.

Mallosoma jucundum Goun. ab. **D'Alessandroi** n. ab. — Elitros con las bandas negras unidas, rodeando un pequeño óvalo central. Se diferencia de la forma normal, por la fusión de las bandas negras, que dejan con el color básico una área pequeña ovalada y dos puntos laterales próximos a ella.

Dedicada a su colector, nuestro consocio y amigo, señor Antonio D'Alessandro, a quien agradezco el obsequio del único ejemplar.

Tipo de Valle Hermoso, Córdoba, I-1943.



A. *Mallosoma jucundum* ab. *D'Alessandroi* n. ab. (× 5)
B. *Mallosoma jucundum* Goun, forma típica.

LAMIIDAE

Aerenea Alvaradoi n. sp.

♂ Cabeza densamente pubescente, clípeo con un dibujo leonado en forma de U ancha, abierta y hendida, cuyo espacio interno está ocupado por una pilosidad blanca entremezclada con castaño rojizo, separada del dibujo anterior por una fina línea obscura. Otro dibujo en forma de V, tien el vértice entre los tubérculos antenníferos y se dirige hacia atrás, cubriendo al final dos tubérculos pequeños alargados con pelos erizados y negros.

Palpos cubiertos por una débil pubescencia gris.

Mandíbulas negras, base con pilosidad leonada. Labro pubescente.

Antenas con escapo robusto y subtuberculado (borde anterior con un tuberculito basal, otro en la parte dilatada de la clava y una uñita apical). Art. 2.°, pubescente, blanco y castaño rojizo claro; art. 3.° y 4.° anillados en gris y pardo; art. 5.° a 10.° con bandas grises, pardo, blanco y pardo oscuro, de apariencia espiralada; art. 11.° unguliforme, con la curva interna glabra.

Pronoto lateralmente oscuro, con las espinas cubiertas de pubescencia pardo rojiza, con dos manchas dorsales blancas que adelgazando se dirigen hacia atrás y continúan en los élitros, en forma



Aerenea Alvaradoi n. sp., paratipo (× 11).



Aerenea Alvaradoi n. sp., paratipo (× 7½).

de línea débil (humeral), con sus tres cuartos finales de color leonado; dos tubérculos aplanados en el tercio anterior y una carena pequeña que partiendo de la depresión que separa a estos últimos, se prolonga ensanchándose hasta el surco transversal que separa el reborde posterior. Todo cubierto de pubescencia gris, pardo y leonado, con puntitos y tubérculos negro brillante.

Elitros cubriendo ampliamente al abdomen, pubescente-tomentosos, tuberculado-punteados, de aspecto general agrisado; hombros salientes y ornados de ferrugíneo y pardo; la sutura cubierta por una fina línea acanelada que lleva una serie de puntos negros impresos; entre la sutura y la línea que parte del pronoto, una corta y débil línea longitudinal blanca. Apice truncado.



Antena de *Aerenea Alvaradoi* n. sp. (× 5).

Escudete subtrapecial, con el borde anterior procurvo, cubierto de alta pilosidad ferrugínea.

Fémures leonados con manchas pardo oscuras y puntos negros nítidos.

Tibias anteriores y medias, manchadas con leonado y negro; posteriores anilladas en los mismos colores y con el ápice castaño rojizo.

Toda la parte inferior cubierta por una densa pubescencia leonada con puntos negros nítidos, con excepción de la parte central de los segmentos abdominales que son glabros.

Todo el insecto, con excepción del abdomen, lleva regularmente dispersos numerosos pelos espatulados blanco brillante.

Lon.: 11 mm., lat. hum. 5 mm.

Próxima a *A. sulcicollis* Melzer, de la que se diferencia, a primera vista, por la falta del surco longitudinal del pronoto.

Holotipo y paratipo en mi colección; procedente de Sumampa, Santiago del Estero III-1943 y IV-1944, Alvarado leg. Dedicada a mi distinguido amigo señor Máximo Alberto Alvarado a quien debe la entomología argentina valiosos descubrimientos.

Dibujos tomados con cámara clara por nuestro consocio y amigo señor Aníbal Bezzi, a quien agradezco su desinteresada colaboración.